


Mang bầu 2 tháng phá thai nội khoa được hay không?

Mang bầu do vỡ kế hoạch gây nhiều vấn đề nhức nhối cho phái nữ. Việc chọn ra kết thúc thai kỳ thường diễn ra với những người không có ý định giữ gìn mang bầu. Bên cạnh việc chọn lọc phá thai bằng biện pháp thủ thuật ngoại khoa thì người mẹ cũng có thể chọn lựa dùng thuốc phá thai nếu như tuổi thai thấp. Tuy nhiên, bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc được không? Tìm trả lời ngay trong nội dung bài viết dưới đây do phòng khám Thái Hà giới thiệu.



Mang thai 2 tháng phá thai bằng thuốc được không?

Biện pháp phá thai bằng thuốc là dùng hợp tác hai loại thuốc để hoàn thành kỳ bào thai gồm có: Mifepristone và Misoprostol. Khi thuốc đi vào cơ thể, nó sẽ gây nên tác động đến bào thai, khiến thai ngừng lại quá trình phát triển, thúc đẩy dạ con không ngừng co thắt để tống xuất thai ra ngoài, hiện tượng này tương tự với khi bị hồng thai. Tính hữu hiệu của giải pháp này khá cao, lên tới 96- 98%.

Thuốc phá thai nên dùng nếu nào? Bầu 2 tháng phá thai bằng thuốc được không? Theo cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa sản, uống thuốc bỏ thai chỉ nên thực hiện khi người sử dụng bỏ thai 7 tuần tuổi trở về trước (thời gian tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của những ngày kinh nguyệt cuối cùng), khi

thai đã bám vào bên trong tử cung của người mẹ, đồng thời sức khỏe cơ thể của bà bầu phải bảo đảm khỏe mạnh, không mắc một số chứng bệnh phụ hoa, bằng thuốc có nguy cơ gây ra tác hại đến sức khỏe thể chất như áp huyết, tim mạch...

Để đảm bảo an toàn, bà bầu nên thăm khám sức khỏe tại những bệnh viện lớn hoặc chuyên khoa y tế đủ đáng tin cậy và uy tín trước khi thực hiện đình chỉ thai kỳ & sau khi đã dùng thuốc. Uống thuốc phá thai cũng được các chuyên gia hoặc bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực y tế khuyến cáo thực hiện tại bệnh viện, nơi có đủ đội ngũ điều dưỡng bác sỹ để an toàn và ngay từ giai đoạn đầu khắc phục tình huống xấu có thể diễn ra.

Quy trình nạo phá thai bằng biện pháp uống thuốc

Trước khi tiến hành phá thai nội khoa tại trung tâm y tế, nhân viên y tế sẽ đưa ra những nghi vấn cho bệnh nhân & tiến hành tiến hành những thủ tục như:

- Bác sĩ hỏi thăm sức khỏe cơ thể của phụ nữ có bầu, đưa ra những giải thích và câu hỏi về phác đồ nạo phá thai, mặt khác giải đáp một số biện pháp phòng tránh thai an toàn.
- Yêu cầu người thực hiện ký bản cam đoan đình chỉ thai nghén.
- Thăm khám và đòi hỏi phụ nữ có bầu tiến hành những xét nghiệm y học sinh thiết cần thiết, qua đây để chuyên gia đưa ra chọn ra chuẩn xác cho việc đình chỉ thai nghén, đình chỉ thai của người mẹ.
- Thấy thuốc sau khi đã thăm khám toàn bộ sẽ khuyến nghị người mẹ thực hiện uống viên thuốc đầu tiên dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ phụ khoa. Thuốc nạo phá thai có lợi ích ảnh hưởng lên tử cung, làm bào thai ngừng tiến triển, túi thai nhẹ nhàng bong khỏi thành dạ con của người mẹ.
- Nếu sau một thời điểm mẹ bầu không có câu hỏi gì sau thời điểm dùng viên thuốc thứ 1 thì phụ nữ có bầu có thể rời bệnh khỏi viện & thực hiện nghỉ ngơi tại nhà.
- Hết bốn mươi tám giờ sau thời điểm uống thuốc, phụ nữ có bầu sẽ lại phải đến trung tâm y tế trước đây để làm kiểm tra & thực hiện dùng tiếp viên thuốc thứ 2. Viên thuốc này có lợi ích đào thải thai nhi ra khỏi cơ thể mẹ. Lúc này, mẹ bầu có thể sẽ có cảm giác bụng đau do tử cung đang vận động co thắt để tống xuất thai ra bên ngoài.
- Sau khi kết thúc quá trình dùng thuốc, thai phụ sẽ được theo dõi nghiêm ngặt dưới sự giám sát của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trong

lĩnh vực phụ sản trong khoảng 4 giờ & kiểm tra mạch, huyết áp 30 phút 1 lần. Trong trường hợp tình trạng sức khỏe cơ thể cung ứng tốt với thuốc, qua thời kỳ để ý phụ nữ có bầu có thể về nhà.

Thông thường sau khi dùng liều thuốc thứ 2, khoảng nửa tiếng đến 4 giờ sau đó người có bệnh sẽ bị bụng đau, ra máu vùng háng và các cục máu đông do thai bị đào thải ra ngoài. Hầu như các nếu như người bị bệnh bị xuất huyết như chu kỳ kinh nguyệt và kéo dài khoảng 10 ngày kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc, thế nhưng một số tình huống đặc biệt có thể bị chảy máu trong thời gian kéo dài gần 4 tuần.

Những ảnh hưởng của thuốc đình chỉ thai nghén

Vậy hồi âm cho câu hỏi “Bầu 2 tháng uống thuốc phá thai được hay không?” đã nói đến ở trên là “không”. Việc dùng thuốc kết thúc thai kỳ khi đã mang bầu 2 tháng không những không phát huy tác dụng của thuốc mà có khi còn có thể gây một số công dụng ngoài ý muốn hoặc phản ứng gây ảnh hưởng cho sức khỏe thể chất của thai phụ. Cho nên, việc kết thúc thai kỳ bằng phương pháp uống thuốc chỉ bảo đảm an toàn khi tuổi thọ của bào thai thấp và phụ nữ mang thai đủ sức khỏe đáp ứng đủ các tiêu chí có thể uống thuốc nạo phá thai.

Phá thai bằng giải pháp uống thuốc có tỉ lệ đạt được kết quả cao, thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không mong muốn. Dùng thuốc đình chỉ thai nghén có thể mắc phải nguy cơ như:

- Dị ứng với đối tượng của thuốc: các vấn đề từ nhẹ đến nặng như mẩn ngứa ngứa, nổi mề đay, tụt huyết áp, khó thở, choáng...
- Cảm thấy nôn mửa, nôn hoặc “tào tháo đui”: Đây là một số triệu chứng bình thường và sẽ hết mau chóng.
- Nhức đầu, chóng mặt, bụng đau: uống đủ nước hoặc nước hoa quả để giảm hiện trạng này. Hoàn toàn chớ nên uống bia, rượu hay cà phê. Nếu như cần thiết có thể vận dụng quan điểm của bác sỹ và sử dụng thuốc giảm đau. Giảm đau bụng bằng các phương pháp vật lý như chườm khăn ấm, chai nước nóng.
- Sốt lâu ngày trong vài giờ, có hoặc không cùng với cơn ớn lạnh.
- Băng huyết & chảy máu: tùy vào cơ địa & sức khỏe thể chất của mỗi người mà tình trạng chảy máu từ tử cung, hành kinh, cơn đau bụng có thể trông thấy ở mức độ nặng hay nhẹ. Nhưng mà nếu như vấn đề này kéo dài mà không nên xử trí có thể làm người có bệnh bị thiếu

- máu, choáng ngất hoặc hôn mê, nặng hơn là bị viêm phụ khoa.
- Viêm nhiễm phụ khoa: rửa ráy còn bẩn sau khi phá thai có thể dẫn đến trạng thái này.
 - Rối loạn nội tiết: Thuốc đình chỉ thai kỳ có thể gây ra ảnh hưởng đến buồng trứng & quá trình rụng trứng của người có bệnh, vì vậy gây ra một số trạng thái rối loạn như kinh nguyệt bị rối loạn hoặc nội tiết.
 - Vẫn còn thai sau thời điểm đã uống thuốc: Để giảm thiểu tình trạng này, trước khi uống thuốc kết thúc thai kỳ cần bảo đảm bản thân đáp ứng đủ điều kiện dùng thuốc.

Sử dụng thuốc phá thai mang tính an toàn và hữu hiệu cao. Nhưng mà, nữ giới nên tránh dùng quá nhiều cách này để thực hiện phá thai nhiều lần. Dù phá thai bằng cách nào thì cũng gây ra ảnh hưởng một mực cho cơ thể, rủi ro bào mòn thành tử cung và làm suy yếu gây hiện trạng khó có bầu, dễ hỏng thai hoặc thai làm tổ bất thường.

Đình chỉ thai nghén tại bệnh viện 103

Bỏ thai tại bệnh viện quân đội 103 là quá trình được thực hiện với sự phục vụ & chuyên nghiệp từ đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm. Trung tâm y tế này không chỉ cung cấp dịch vụ y tế tin cậy mà còn cam đoan bảo đảm an toàn & tôn trọng đối với quyết định của người bệnh.

Bệnh viện quân y 103, những thầy thuốc & điều dưỡng không chỉ có kỹ thuật cao mà lại có tâm tính nhân bản, đồng cảm với cảm xúc và ý muốn của phụ nữ. Quá trình san sẻ trước & sau thời điểm bỏ thai là cấp bách, giúp người mang bệnh nắm rõ về lộ trình & có quyền chọn lựa phù hợp kết hợp với nếu như của mình.

Bệnh viện quân đội 103 còn coi trọng đến việc giảm đau & tạo hoàn cảnh thư giãn nhất cho người mang bệnh trong suốt quá trình phá thai. Bên cạnh đó, họ cũng đảm bảo rằng mọi thông tin có mối liên quan đến quá trình đình chỉ thai nghén đều được giữ bí mật & giữ bí mật đáo.

Nguồn nhân lực y thầy thuốc chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng tiên tiến & tầm khoảng nhìn nhân bản, bệnh viện 103 là địa điểm chất lượng cho chị em phụ nữ khi cần hỗ trợ trong quá trình bỏ thai, mang lại cho họ sự yên tâm và phục vụ chu đáo tận tình.

Phá thai ở hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa gần nhất

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Chi phí cho 1 lần phá thai <https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

<https://phathaihaiha.webflow.io>

Phòng khám 11 Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Fanpage phòng khám đa khoa 11 Thái Hà:

<https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>